

L'utente/paziente che debba essere sottoposto a CARDIO-TC deve essere premedicato a casa con Ivabradina (in assenza di controindicazioni, vedi oltre) nei tre giorni precedenti l'esame secondo il seguente schema:

Esame programmato PRIMA delle ore 14.00:	1	2	3	Giorno esame
Mattina presto	7,5 mg	7,5 mg	7,5 mg	7,5 mg
				esame
Sera	7,5 mg	7,5 mg	7,5 mg	

Esame programmato DOPO le ore 14.00:	1	2	3	Giorno esame
Mattina presto	-	7,5 mg	7,5 mg	7,5 mg
				7,5 mg alle 12.30
Sera	7,5 mg	7,5 mg	7,5 mg	

Il paziente continuerà ad assumere tutti i farmaci che già assume come prescritto dal suo medico. Nel paziente con frazione di eiezione < 50% il dosaggio della Ivabradina è 5mg seguendo lo schema previsto.

L'Ivabradina non dovrà essere assunta dai pazienti con le seguenti controindicazioni:

- ipersensibilità nota al principio attivo
- sindrome del nodo del seno
- angina instabile
- ipotensione
- blocco seno-atriale
- gravidanza e allattamento.

Etichetta Dati  
oppure  
Cognome Nome e data di nascita

L'utente/paziente che debba essere sottoposto a CARDIO-TC deve poi essere premedicato in Radiologia il giorno dell'esame secondo il seguente schema:

- Delorazepam (1mg/ml) 10 gocce per os 15' prima dell'esame
- Isosorbide dinitrato (Carvasin) 5 mg compresse, 1 compressa sublinguale appena prima dell'esame
- Metoprololo tartrato (1mg/ml) 5 ml diluiti in 20 ml di fisiologica, con paziente già posizionato sul lettino pronto per l'esame (si somministra solo se la frequenza cardiaca è sopra i 60 battiti /min fino ad una massima somministrazione di tre fiale).

DATA \_\_\_\_\_

ORA \_\_\_\_\_

L'infermiere

Timbro e firma del Medico

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_