

## INDICAZIONI PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE

Gli esami radiologici che prevedono l'utilizzo di MdC organo-iodato per via iniettiva richiedono per la loro esecuzione accertamenti ematochimici preliminari (creatinina e clearance misurata o calcolata) al fine di evitare danni renali da nefrotossicità.

Il prescrittente, richiesti gli esami emato-chimici, dopo valutazione dei risultati, DEVE attenersi alle seguenti indicazioni:

**VALORI DI CREATININA PLASMATICI \* > 1,3 mg/dl (uomini) o Cr. Clearance < a 60 ml/min  
> 1 mg/dl (donne) o Cr. Clearance < a 60 ml/min.**

ASSUNZIONE di liquidi per os con abbondante idratazione (circa 2 LT).

In caso di necessità di somministrare ev la terapia idratante:

– SOMMINISTRAZIONE DI LIQUIDI ev

- Soluzione fisiologica ev (500 ml di fisiologica + 500 ml di Glucosata al 5%):
  - 1000 ml iniziando l'infusione 6 ore prima dell'esecuzione dell'esame
  - 1000 ml nelle 6 ore successive all'esecuzione dell'esame.

Alla suddetta terapia aggiungere ACETILCISTEINA PER OS\*\*

- 600 mg (1 Cp) la mattina e la sera del giorno prima dell'esecuzione dell'esame
- 600 mg (1 Cp) la mattina e la sera del giorno dell'esecuzione dell'esame

## MONITORAGGIO DIURESIS

CONTROLLO ESAMI FUNZIONE RENALE DOPO 1 SETTIMANA DALL'ESECUZIONE DELL'INDAGINE DIAGNOSTICA.

\* valori di riferimento del Laboratorio di Patologia Clinica Ospedale Esine

\*\* farmaco "off label"

Esine/Edolo \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DI UO RADIOLOGIA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ ha seguito le indicazioni sopra riportate.

Firma \_\_\_\_\_

N.B. in caso di mancata preparazione l'esame richiesto NON può essere eseguito.